


Lágstemmt óráð – HYPOactive delirium



algengar mismunagreiningar eru þunglyndi eða heilábilun

Vanvirkni og svefnhöfgi eru ríkjandi

minnkuð líkamleg virkni talar hægar og lægra

minnkuð árvekni skert athygli

hæg viðbrögð og dregur sig í hlé

framtaksleysi minnkuð matarlyst

hægari hreyfingar sinnuleysi

Lágstemmt óráð er algengara og er líklegra til að vera vangreint



Sjúklingar í óráði eru í mikilli byltuhættu, eru líklegri til að fá þrýstingsrás, dvelja lengur á spítala og útskrifast frekar á hærra þjónustustig



Óráð er hægt að fyrirbyggja í að minnsta kosti þriðjungji tilfella



Í um helmingi tilfella er óráð ýmist vangreint eða misgreint sem eitthvað annað



Óráð er hægt að fyrirbyggja í að minnsta kosti þriðjungji tilfella



Hástemmt óráð HYPERactive



Ofvirkni og eirðarleysi eru ríkjandi

aukin hreyfivirkni tala hraðar og hærra

óróleiki og ráf rugl

svefnerfiðleikar

Flestir hafa blöndu af lágstemmdu og hástemmdu óráði

